Activité : Vers la loi normale centrée et réduite

Au XVIIe siècle, Jacques Bernoulli et Abraham de Moivre cherchent à calculer des probabilités dans le cadre d'une loi binomiale.

JACQUES BERNOULLI
(1654-1705)

ABRAHAM DE MOIVRE
(1667-1754)

Celles-ci sont définies par la formule $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

et les coefficients $\binom{n}{k}$ (lire "k parmi n") sont difficiles à calculer notamment en l'absence d'ordinateurs (!).

DEPLOYING A NEWLY INVENTED WEAPON, THE CALCULUS, DE MOIVRE SHOWED THAT WHEN $p=0.5$, THE BINOMIAL DISTRIBUTION WAS CLOSELY APPROXIMATED BY A CONTINUOUS DENSITY FUNCTION WHICH COULD BE DESCRIBED VERY SIMPLY.

Source : Larry Gonick, Woolcott Smith - *The cartoon guide to statistics*

De Moivre propose alors une approximation de la loi binomiale dans le cas où $p = \frac{1}{2}$ à l'aide d'une loi de probabilité à densité. Essayons de comprendre graphiquement cette approximation.

Pour cela, on considère une variable aléatoire X_n suivant la loi binomiale de paramètre n et $p = \frac{1}{2}$.

1. On a représenté ci-dessous la loi de X_n par un histogramme d'aire totale égale à 1, dans les cas où $n=100$ et $n=200$.

Quelles caractéristiques communes présentent ces diagrammes de X_n ?

.....

.....

.....

.....

.....

2. Afin de faire apparaître la densité tant attendue, on transforme l'histogramme de la variable X_n grâce à deux opérations, comme représenté ci-dessous.

Mathématiquement, les deux opérations ci-dessus (« slide and squash ») reviennent à étudier la variable aléatoire Z_n

définie par $Z_n = \frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} = \frac{X_n - m}{\sigma}$, où m est l'espérance de X_n et σ son écart-type.

Déduire des dessins ci-dessus l'espérance et l'écart-type de la variable Z_n (*mean* signifie moyenne et *standard deviation* signifie écart-type) :

Espérance de Z_n : Ecart-type de Z_n :

3. On a représenté par un histogramme la loi de probabilité de Z_n dans les cas $n = 100$ et $n = 200$.

a. Interpréter graphiquement $P(-1 \leq Z_n \leq 1)$.

.....

b. Sur le second histogramme, on a tracé la courbe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

a. Que constate-t-on ?

.....

b. Interpréter graphiquement $\int_{-1}^1 f(x) dx$.

.....

Conclusion :

Pour n grand, la loi de probabilité de la variable aléatoire Z_n est proche de celle d'une variable Z ayant pour densité la

fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

Cette loi de probabilité est appelée **loi normale centrée réduite**.