

1 Probabilité conditionnelle

1.1 Définition

Définition

Soit P une probabilité sur un univers Ω et soit A un événement de probabilité non nulle.

Pour tout événement B , on appelle **probabilité de B sachant A** le réel, noté $P_A(B)$, défini par :

$$P_A(B) = \dots\dots$$

1.2 Propriétés

- P_A est une probabilité, dite **probabilité conditionnelle**, définie sur Ω .

En effet P_A vérifie les propriétés d'une probabilité :

$$P_A(\Omega) = \dots\dots$$

$$P_A(\emptyset) = \dots\dots$$

Et pour tout événements B et C incompatibles, ($B \cap C = \emptyset$), on a : $P_A(B \cup C) = P_A(B) + P_A(C)$.

- $P_A(A) = \dots\dots$

- si A et B sont incompatibles alors $P_A(B) = \dots\dots$

- $P_A(\overline{B}) = \dots\dots$

Démonstration : $\dots\dots$

1.3 Probabilité de $A \cap B$

Soit A et B des événements de probabilité non nulle, on a :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad \text{donc } \dots\dots$$

de même :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{et par suite : } \dots\dots$$

On en déduit que :

Propriété

Pour tous événements A et B de probabilité non nulle,

$$P(A \cap B) = \dots\dots\dots$$

Remarque : si $P(A) = 0$ ou $P(B) = 0$, alors $P(A \cap B) = \dots$

1.4 Représentation par un arbre pondéré

Exemple : tous les élèves de Terminale d'un lycée ont passé un test de certification en Anglais. 80% ont réussi le test. Parmi ceux qui ont réussi le test, 95% n'ont jamais redoublé. Parmi ceux qui ont échoué au test, 2% n'ont jamais redoublé.

On considère les événements T : « L'élève a réussi le test » et D : « L'élève a déjà redoublé ».


On peut représenter cette expérience à l'aide d'un arbre pondéré, en respectant certaines règles.

Règle 1 : Sur les branches du premier niveau, on inscrit les probabilités des événements correspondants.

Règle 2 : Sur les branches du deuxième niveau, on inscrit des probabilités conditionnelles.

Règle 3 : La somme des probabilités inscrites sur les branches issues d'un même nœud est égale à ...

Règle 4 : Le produit des probabilités des événements rencontrés le long d'un chemin est égal à la probabilité de ...



Par exemple, ici : $P(T \cap \overline{D}) = \dots\dots$

Règle 5 : La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins conduisant à cet événement.

Par exemple, ici : $P(D) = \dots\dots\dots$

2 Formule des probabilités totales

2.1 Exemple


Trois machines M_1 , M_2 , et M_3 réalisent respectivement 20%, 30% et 50% de la production d'une entreprise. On estime à 1,5%, 2% et 1% les proportions de pièces défectueuses produites respectivement par M_1 , M_2 et M_3 .

On choisit une pièce au hasard dans la production.

L'objectif est de calculer la probabilité de l'évènement B : « La pièce est bonne ».

Pour tout entier i de 1 à 3, on note M_i l'évènement : « La pièce est produite par M_i ».

On peut illustrer la situation par un arbre pondéré :



On calcule les probabilités correspondant aux trois chemins menant à la réalisation de l'évènement B : ce sont les chemins

B est la réunion de ces évènements deux à deux incompatibles, d'où :

$P(B) = \dots\dots\dots$

On peut détailler les calculs dans le tableau suivant :

	B	$\overline{B}$	
M_1			$P(M_1) = \dots\dots\dots$
M_2			$P(M_2) = \dots\dots\dots$
M_3			$P(M_3) = \dots\dots\dots$
	$P(B) = \dots\dots\dots$	$P(\overline{B}) = \dots\dots\dots$	1

2.2 Cas général : formule des probabilités totales

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont des sous-ensembles non vides de Ω , deux à deux disjoints et dont la réunion est Ω on dit qu'ils constituent

Théorème (Formules des probabilités totales (admis))

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ constituent une partition de Ω et B est un évènement quelconque de Ω , alors :

$$P(B) = \dots\dots\dots$$

$$P(B) = \dots\dots\dots$$

3 Indépendance

3.1 Événements indépendants

On suppose que A et B sont des événements tels que $P(A)$ et $P(B)$ sont non nulles.

Si le fait que A est réalisé ne change pas la probabilité que B le soit, on dit alors que B est indépendant de A , ce qui signifie que : $P_A(B) = P(B)$.

Puisque $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$, il en résulte que $P(A \cap B) = \dots\dots$

Alors $P(A) = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$, donc $\dots\dots\dots$

D'où la **définition** :

Définition

Deux événements A et B sont **indépendants** si et seulement si

$\dots\dots\dots$

Dans ce cas, si $P(A) \times P(B) \neq 0$, alors :

$$P_A(B) = \dots\dots\dots \text{ et } P_B(A) = \dots\dots\dots$$

Noter que si $P(A) = 0$ ou $P(B) = 0$, alors $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \dots\dots\dots$

Remarque :

Pour des événements A et B de probabilité non nulles, il ne faut pas confondre indépendance et incompatibilité.

" A et B incompatibles" signifie $\dots\dots\dots$, donc $P(A \cap B) = \dots\dots$

" A et B indépendants" signifie $P(A \cap B) = \dots\dots\dots$, donc $P(A \cap B) \dots\dots\dots$

Si A et B sont incompatibles alors ils ne sont pas indépendants et s'ils sont indépendants alors ils $\dots\dots\dots$

Exemple :

On lance un dé à 6 faces équilibré. On considère les événements suivants :

A : « le résultat est pair »

B : « le résultat est 2 »

C : « le résultat est supérieur ou égal à 5 »

Les événements A et B sont-ils indépendants ? Les événements A et C ? Les événements B et C ?

3.2 Passage aux événements contraires

Si A et B sont deux événements indépendants alors $\overline{A}$ et B sont indépendants.
--

Démonstration (ROC) :